

▸ Tilttest/kantelafeltest

1. Doel van het onderzoek

Een tilttest, ook wel kantelafeltest genoemd, wordt uitgevoerd bij mensen die last hebben van duizeligheid en/of flauwvallen. Tijdens het onderzoek wordt uw bloeddruk en uw hartritme gevolgd. Zo kan in sommige gevallen duizeligheid of flauwvallen uitgelokt worden en kan eventueel een diagnose gesteld worden.

2. Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u **nuchter** zijn. Niets eten of drinken.

Als u een kunstgebit heeft, moet u dit verwijderen.

Als u diabetespatiënt bent, meld dit dan bij

Het maken van de afspraak.

Breng uw eigen glucometer mee en druivensuiker

of iets om te eten in geval van hypoglycemie.

Noteer uw ochtendwaarde (glycemie) en geef dit

af aan de verpleegkundige.

Laat iemand u voeren, u mag zelf geen voertuig besturen na het onderzoek!

3. Dag van het onderzoek

- Kom nuchter naar het ziekenhuis.
- Breng uw elektronische identiteitskaart en aanvraag van uw behandelende arts mee.
- Schrijf u een half uur voor het afgesproken uur in aan de inschrijvingskiosk, rechts naast de infobalie als u het ziekenhuis binnenkomt.
- Na de inschrijving gaat u naar **wachtzaal 10** op de eerste verdieping (polikliniek).
- Chauffeur/begeleider kunnen tijdens het onderzoek in de wachtzaal wachten.
- Duur van het onderzoek: **90 minuten**.

4. Uitvoering van het onderzoek

- Gelieve voor het onderzoek nog eerst te wateren. Tijdens het onderzoek is dit niet meer mogelijk.
- U wordt geïnstalleerd op een speciale tafel.
- De verpleegkundige neemt een elektrocardiogram. De elektroden blijven aanwezig zodat uw hartritme tijdens de test gevolgd kan worden. Ook uw bloeddruk wordt regelmatig genomen.
- De verpleegkundige plaatst een infuus en maakt u met zachte banden vast aan de tafel zodat u bij het rechtekomen niet van de tafel kunt vallen.
- De eerste 15 minuten ligt u horizontaal, dan wordt de tafel geleidelijk rechtop gezet tot 70°. U staat dan licht achterover geheld.

- Als er klachten optreden, meld dit dan aan de verpleegkundige.
- Als u het bewustzijn verliest, wordt de tafel terug horizontaal gezet.

Verliest u het bewustzijn niet, dan eindigt het onderzoek na 45 minuten. De elektroden, banden en infuus worden verwijderd.

5. Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden naar uw behandelende arts gestuurd.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met raad en daad bijstaan.

Contactinfo

Polikliniek cardiologie

03 650 50 54



Tilttest/
kanteltafeltest
informatiebrochure

Versie / 10-2019

Auteur: policardio, V.U. Hoofdart

AZ Klina
Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
info@klina.be
www.azklina.be

AZ Klina 
▶ voluit voor zorg

AZ Klina 
▶ voluit voor zorg