

► Transoesofagale echografie

1. Doel van het onderzoek

Tijdens dit onderzoek kan de arts de hartstructuren bestuderen die met een thoracale echografie (uitwendig op de borstkas) en andere methoden van medische beeldvorming niet mogelijk zijn.

2. Voorbereiding

Voor dit onderzoek dient u **6 uur voor het onderzoek nuchter** te zijn: niets eten of drinken.

Diabetespatiënten vermelden dit bij het maken van de afspraak. Breng uw eigen glucometer mee en druivensuiker of iets om te eten in geval van hypoglycemie.

Noteer uw ochtendwaarde (glycemie) en geef dit af aan de verpleegkundige.

Het is aangeraden om begeleiding te voorzien.

3. Dag van het onderzoek

- Kom **nuchter** naar het ziekenhuis.
- Breng uw elektronische identiteitskaart en aanvraag van uw behandelende arts mee.
- Schrijf u een half uur voor het afgesproken uur in aan de inschrijvingskiosk, rechts naast de infobalie als u het ziekenhuis binnenkomt.
- Na de inschrijving gaat u naar **wachtzaal 10** op de eerste verdieping (polikliniek).
- Begeleiders kunnen tijdens het onderzoek in de wachtzaal wachten.

4. Uitvoering van het onderzoek

De verpleegkundige prikt eerst een infuus in uw rechterarm. Indien u een kunstgebit heeft moet u dit verwijderen. De verpleegkundige verdooft uw keel. U moet dan op uw linkerzijde gaan liggen met uw kin op de borst. Er worden electrocardiogramelektroden aangebracht op uw borst om uw hartritme tijdens het ganse onderzoek te kunnen volgen.

Men meet ook het zuurstofgehalte in uw bloed door middel van een klem op uw vinger. (saturatiemeter)

- U krijgt een mondstuk in uw mond, zodat u niet per ongeluk op de sonde kan bijten. De echografiesonde wordt ingebracht via de mond en zal via de slokdarm beelden maken van het hart. Eventueel krijgt u bijkomend verdoving.

Na het maken van de gewenste beelden zal de arts de sonde verwijderen en wordt het mondstuk weggenomen.

Het infuus wordt door de verpleegkundige verwijderd.

Belangrijk: na het onderzoek is het belangrijk dat u zeker **60 minuten** wacht voor u iets drinkt of eet !

Dit om verslikking te voorkomen door de keelverdoving.

Nadien mag u voorzichtig water met kleine slokjes nemen.

Indien u zich niet verslikt, kan u nog een half uur later eten.

5. Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden naar uw behandelende arts gestuurd.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met raad en daad bijstaan.

Contactinfo

Polikliniek cardiologie

03 650 50 54



Transoesofagale echografie (TEE) *informatiebrochure*

Versie / 10-2019

Auteur: policardio, V.U. Hoofdarts

AZ Klina
Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
info@klina.be
www.azklina.be

AZ Klina 
▶ voluit voor zorg

AZ Klina 
▶ voluit voor zorg